P20) EPIDEMIOLOGIA ACTUAL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA EN UN HOSPITAL TERCIARIO

Barrera, D.(1); Kramer, F.(2); Dominguez, J.(2); Rojas, F.(1); Kompatzki, A.(1); Andrusco, A.(1); Bernal, J.(1); Valderrama, R.(1); Saavedra, A.(1); Bernal, J.(1); Hargous, J.(1); Souper, R.(1); Arenas, J.(1);

(1): Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La prevalencia del Cáncer de próstata (CaP) en Chile es desconocida, sin embargo su mortalidad ha ido en aumento, siendo el año 2017 una de las primera causas de mortalidad por cáncer en hombres. Tampoco se conoce qué porcentaje de hombres se presentan con cáncer metastásico al diagnóstico de la enfermedad, los cuales tienen la mortalidad más alta.

OBJETIVO: Evaluar las variables demográficas y clínicas de los pacientes al momento del diagnóstico de CaP, para poder definir además nuestra tasa de pacientes metastásicos al diagnóstico.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisó la base de datos de pacientes notificados GES por CaP entre 2014 y 2016. Se analizaron las variables demográficas, valor APE, estadio clínico al momento del diagnóstico y manejo posterior de su CaP. Se clasificaron como cáncer localizado, localmente avanzado y metastásico según los hallazgos clínicos, del TAC y cintigrama óseo según corresponda. Se obtuvieron registros de ficha electrónica, anatomía patológica y protocolos operatorios.

RESULTADOS: Se obtuvieron un total de 266 pacientes, el promedio de edad fue 68,9 años. Del total de pacientes al momento del diagnóstico el 47 % se encontraba localizado, el 15,4 % localmente avanzado y el 37,6 % metastásicos. Durante el periodo además se observó un aumento gradual en la tasa de pacientes con CaP localizado al diagnóstico, siendo el 2014 un 37,2 % ; el 2015 un 45,5 % y el 2016 un 54,9 % . Además una disminución de la tasa de pacientes metastásicos al diagnóstico, siendo el 2014 un 41 % ; el 2015 un 40,2 % y el 2016 un 33,4 % .

CONCLUSIONES: En nuestro medio el cáncer de próstata se sigue diagnosticando de manera tardía, con una alta tasa de pacientes que se presentan metastásicos al diagnóstico, sin embargo se observa un aumento progresivo e importante de los pacientes con cáncer localizado el diagnóstico.